

表 4 优选重病前症分类代码及定义 (续)

代码	名称	定义
DS008	短暂性脑缺血发作 (TIA)	颈动脉或椎-基底动脉系统发生短暂性血液供应不足,引起局灶性脑缺血导致突发的、短暂性、可逆性神经功能障碍。发病无先兆,发作持续数分钟,有过性的神经系统定位体征,通常在30分钟内完全恢复,无后遗症。症状结合必要的辅助检查,且排除其他脑血管病后才能诊断短暂性脑缺血发作。
DM	多器官损害类病症	
DM001	原发性高血压病	体循环动脉血压(收缩压和/或舒张压)增高的疾病,需满足如下条件: a) 收缩压 ≥ 160 毫米汞柱,或舒张压 ≥ 90 毫米汞柱,至少3次在非同日静息状态下测得血压升高; b) 未发现引起血压升高的其它病因; c) 可伴有脑、心、肾等器官的高血压特征的功能或器质性损害的临床综合表现。
DM002	2型糖尿病	是一组以高血糖为特征的慢性代谢性疾病。需符合如下标准(2019年ADA(美国糖尿病协会)标准): a) 糖化血红蛋白 $\geq 6.5\%$; b) 空腹血糖 FPG ≥ 7.0 mmol/L,或OGTT 2小时血糖 ≥ 7.8 mmol/L,或8小时内无热量摄入; c) 口服糖耐量试验时2小时血糖 ≥ 11.1 mmol/L; d) 有典型的高血糖或高血糖危象症状的患者,随机血糖 ≥ 11.1 mmol/L。上述标准中任意一条符合即可诊断。标准a)~c)应通过重复检测来证实标准a)~c)。
DM003	重度肥胖且 BMI >35	体内脂肪组织堆积,超过标准体重50%,并且BMI大于36。
DM004	睡眠呼吸暂停综合征	由于各种原因导致睡眠时上气道狭窄和阻塞的一种睡眠呼吸疾病,表现为夜间睡眠打鼾伴呼吸暂停和白天嗜睡等异常症候。由于上气道塌陷、呼吸暂停引起反复发作的夜间低氧和高碳酸血症给人体带来危害,通过检查和多导睡眠监测结果综合评估可诊断为睡眠呼吸暂停综合
DR		